



*Liječniku se javite odmah i bez odlaganja, u slijedećim slučajevima:*

- Jaka mučnina i povraćanje, povraćanje više od tri puta dnevno u prvom trimestru trudnoće, te povraćanje kasnije u trudnoći osobito ako niste ranije povraćali.
- Oštra bol u donjem dijelu trbuha, osobito ako bol ne popušta, ili je praćena mučninom, povraćanjem i/ili krvarenjem.
- Krvarenje tijekom trudnoće, bilo da se radi o oskudnom ili obilnom vaginalnom krvarenju, krvarenju iz bradavica, rektuma ili mjehura, te iskašljavanje krvi.
- Povišena tjelesna temperatura iznad 38.5° C.
- Osjećaj pečenja i/ili bolovi prilikom mokrenja, osobito uz povišenu temperaturu iznad 38.5°C i/ili bolovima u leđima. Smanjenje učestalosti mokrenja, smanjenje količine urina, ili izostanak mokrenja cijeli dan uz pojačani osjećaj žeđi.
- Jaka glavobolja koja traje više od dva ili tri sata, osobito ako je praćena smetnjama u vidu ili otjecanjem lica, otocima oko očiju ili otocima na šakama, nesvjesticom i vrtoglavicom.
- Smetnje vida (mutni vid, dvostrukе slike, zamagljeni vid ..) koje traju duže od dva sata, naročito ako ih prate nesvjestica, vrtoglavica i glavobolja.
- Istjecanje tekućine iz vagine, osobito istjecanje tekućine u mlazu.
- Iznenadni porast više od jednog kilograma težine, praćen otjecanjem lica i naročito pojmom otoka oko očiju, otjecanjem šaka i/ili glavoboljom i/ili smetnjama vida.
- Odsutnost primjetnih pokreta ploda tijekom više od 24 sata nakon 20. tjedna trudnoće. Manje od deset pokreta djeteta dnevno nakon 28. tjedna trudnoće.